



A Beneficência
Portuguesa
de São Paulo

Protocolos abertos para recrutamento
Centro de Pesquisa Clínica

Hematologia

Atualizado em dezembro de 2024



Mieloma Múltiplo

MajesTEC-4

PI: Dra. Danielle Leão

[Link Clinical Trials](#)

Intervenção:

Braço A: Teclistamab + Lenalidomida

Braço B: Lenalidomida monoterapia

Braço C: Teclistamab monoterapia

Critérios:

Participantes com mieloma múltiplo recém diagnosticado, como terapia de manutenção após transplante autólogo de células-tronco

LINKER-MM3

PI: Dra. Danielle Leão

[Link Clinical Trials](#)

Intervenção: Linvoseltamabe (anticorpo biespecífico anti-BCMA x anti-CD3) vs. combinação de Elotuzumabe, Pomalidomida e dexametasona (EPd)

Critérios:

MM recidivado/refratário que receberam de 1 a 4 linhas anteriores de terapia, incluindo um inibidor de proteassoma e lenalidomida

MonumenTAL-6

PI: Dr. Breno de Gusmão

[Link Clinical Trials](#)

Estudo fase 3: comparação de Talquetamabe SC + Pomalidomida (TAL-P) vs Talquetamabe SC + Teclistamabe SC (TAL-TEC) vs escolha do investigador Elotuzumabe + Pomalidomida + Dexametasona (EPd) ou Pomalidomida + Bortezomibe + Dexametasona (PVD)

Critérios:

Participantes com MM recaído ou refratário que receberam de 1 a 4 linhas de terapias anteriores, incluindo um anticorpo anti-CD38 e lenalidomida.

MagnetisMM-7

PI: Dr. Breno de Gusmão

[Link Clinical Trials](#)

Estudo fase 3: randomizado, de dois grupos de Elranatamabe (PF-06863135) vs Lenalidomida em participantes com MM recém-diagnosticado após serem submetidos a transplante autólogo de células-tronco.

Critérios:

Participantes com idade ≥ 18 anos, com doença mensurável no diagnóstico, conforme definido pela proteína M sérica $\geq 0,5$ g/dL (5 g/L), proteína M urinária ≥ 200 mg/24 horas ou ensaio de FLC sérica com nível de FLC envolvido ≥ 10 mg/dL, desde que a razão da FLC sérica seja anormal.

Mieloma Múltiplo

MajesTEC-9

PI: Dra. Danielle Leão

[Link Clinical Trials](#)

Estudo fase 3: avaliação de Teclistamabe Monoterapia vs Pomalidomida, Bortezomibe, Dexametasona (PVd), ou Carfilzomibe, Dexametasona (Kd).

Critérios:

Participantes com MM recaído ou refratário que receberam uma a três linhas anteriores de terapia, incluindo um anticorpo monoclonal anti-CD38 e lenalidomida.

Doenças Linfoproliferativas

SYMPHONY-1

PI: Dra. Danielle Leão

[Link Clinical Trials](#)

Intervenção: Tazemetostat + Lenalidomida + Rituximabe vs. Placebo + Lenalidomida + Rituximabe

Critérios:

Linfoma Folicular (graus 1 à 3A) recidivado/refratário, tratados com pelo menos 1 linha de terapia anterior. Pacientes com ECOG \leq 2

Globryte

PI: Dra. Danielle Leão

[Link Clinical Trials](#)

Estudo fase 3: avaliar Glofitamab em Monoterapia vs escolha do investigador (Rituximab + Bendamustina ou Rituximab + Lenalidomida) em participantes com linfoma de células do manto recidivado ou refratário

Critérios:

Participantes com linfoma do manto recidivado ou refratário tratados com pelo menos 1 linha de terapia anterior incluindo um inibidor de BTK e opção de terapia sistêmica adicional

LOTIS-5

PI: Dra. Danielle Leão

[Link Clinical Trials](#)

Estudo fase 3: comparação de Loncastuximabe Tesirina combinado com Rituximabe vs Imunoquimioterapia (R-Gemox) em pacientes com linfoma difuso de grandes células B recidivante ou refratário

Critérios:

Participantes com linfoma difuso de grandes células B recidivado ou refratário após 1 linha de tratamento

LOTIS-10

PI: Dra. Danielle Leão

[Link Clinical Trials](#)

Estudo fase 1B: avaliação da farmacocinética e da segurança de Loncastuximabe Tesirina em pacientes com Linfoma Difuso de grandes células B Recidivante ou refratário ou linfoma de células B de alto grau com insuficiência hepática

Critérios:

Participantes com linfoma difuso de grandes células B recidivado ou refratário que receberam pelo menos um regime de tratamento sistêmico.

Doenças Linfoproliferativas

BGB-16673-101

PI: Dra. Danielle Leão

[Link Clinical Trials](#)

Estudo fase 1/2: aberto, avaliar a segurança, tolerabilidade, eficácia, farmacocinética e farmacodinâmica de BGB-16673 em monoterapia em participantes com malignidades de células B

Critérios:

Participantes com linfoma de células do manto recidivado ou refratário previamente tratados com um inibidor de BTK.

Doenças Mieloproliferativas

KER-050

PI: Dr. Fabio Pires

[Link Clinical Trials](#)

Intervenção: KER-050 monoterapia vs. KER-050 +
Ruxolitinibe

Critérios:

Mielofibrose (Primária ou Secundária a Policitemia Vera/ Trombocitemia Essencial) anteriormente tratado com inibidor(es) de JAK ou não elegível para inibidor(es) de JAK